

Herstelplan Enkelverzwikking | Lateraal Bandletsel

Buitenste enkelbanden (ATFL / CFL) | Jeugdvoetbal

Locatie	Doelgroep	Kenmerken
Buitenzijde enkel — ATFL (meest kwetsbaar), CFL, PTFL	Jeugdvoetballers alle leeftijden — Ottawa Ankle Rules bij jeugd altijd toepassen	Zwelling buitenzijde · Pijn bij belasten · Instabiliteitsgevoel

Wat is een enkelverzwikking aan de buitenzijde?

Een enkelverzwikking (supinatieletsel) is de meest voorkomende sportblessure bij voetballers van alle leeftijden. De enkel slaat naar binnen (supinatie/inversie), waardoor de banden aan de buitenzijde overrekt of gescheurd worden. Er ontstaat zwelling, pijn en instabiliteit aan de buitenkant van de enkel.

De drie banden die bij een laterale enkelverzwikking kunnen worden aangedaan zijn: het ligamentum talofibulare anterius (ATFL — meest kwetsbaar), het ligamentum calcaneofibulare (CFL) en het ligamentum talofibulare posterius (PTFL — zelden betrokken). Hoe meer banden beschadigd zijn, hoe ernstiger het letsel.

Ernstgraden van het bandletsel			
Graad	Bandletsel	Zwelling / pijn	Belastbaarheid
Graad I (licht)	Overrekking, geen scheur	Lichte zwelling, milde pijn	Direct volledig belastbaar
Graad II (matig)	Gedeeltelijke scheur (ATFL)	Matige zwelling, duidelijke pijn	Belastbaar met pijn; instabiel gevoel
Graad III (zwaar)	Complete scheur (ATFL + CFL)	Forse zwelling, ernstige pijn	Nauwelijks belastbaar; duidelijke instabiliteit

Eerst uitsluiten voor start programma

Ottawa Ankle Rules: botvulling boven/achter de buitenste enkelknop, botvulling middenvoet of niet kunnen stappen → röntgenfoto om botbreuk of groeischijfletsel uit te sluiten

Graad III letsel: doorverwijzen naar arts/fysiotherapeut

Eerste opvang: POLICE-protocol (eerste 48–72 uur)

P – Protection	Bescherm de enkel direct na het letsel; vermijd verdere belasting die pijn provoceert.
OL – Optimal Loading	Belasten zoveel als pijnvrij mogelijk is — volledige rust vertraagt herstel. Lopen op krukken indien nodig.
I – Ice	Ijs (15–20 min) direct na letsel en 3–4x daags de eerste 48–72 uur. Nooit direct op de huid.
C – Compression	Elastische zwachtel of compressiekous om zwelling te beperken — niet te strak.
E – Elevation	Enkel omhoog leggen boven harthoogte om zwelling te verminderen — zoveel mogelijk de eerste 48 uur.
Let op	Anti-ontstekingsmiddelen (bijv. ibuprofen) kunnen de eerste 48–72 uur zwelling en pijn verlichten — altijd overleggen met ouders/arts.

Doelstellingen van het herstelprogramma

- Zwelling en pijn verminderen en beheersen

- Volledig gewrichtsbereik van de enkel herstellen
- Kracht van de enkel- en kuitmusculatuur opbouwen
- Proprioceptie (positiegevoel) en neuromusculaire controle herstellen — cruciaal ter voorkoming van terugval
- Vertrouwen in de enkel bij richtingsverandering, landing en duel terugwinnen
- Geleidelijke opbouw naar volledig voetballen inclusief intensieve sprongen en duels

Algemene richtlijnen	
Pijn als graadmeter	Stop bij pijn >3/10. Lichte ongemak bij balanswerk ($\leq 2/10$) is acceptabel.
Taping / brace	Profylactisch taping of enkelbrace sterk aanbevolen bij alle voetbalactiviteiten tot 6 weken na terugkeer.
Zwelling bewaken	Zwelling die niet afneemt na rust en ijs is een teken van te hoge belasting — terugschalen.
Proprioceptie prioriteit	Balans- en coördinatieoefeningen zijn minstens even belangrijk als krachtoefeningen — niet overslaan.
Symmetrie	Vergelijk looppatroon, balanstijd en sprongafstand links/rechts voor terugkeer.

Faseoverzicht programma 4–6 weken				
Fase	Periode	Doel	Belasting	Voetbal
Fase 1	Dag 1–5	POLICE & pijncontrole	Beschermd lopen	Niet
Fase 2	Week 1–2	Beweeglijkheid & lichte kracht	Pijnvrij belasten	Niet
Fase 3	Week 2–3	Kracht & proprioceptie	Gematigd, <3/10	Lichte passing
Fase 4	Week 3–4	Functioneel looperstel	Matig-hoog	Passing + loopdrills
Fase 5	Week 4–5	Voetbalspecifiek & duels	Hoog, deeltraining	Gedeeltelijke training
Fase 6	Week 5–6	Volledige terugkeer	Wedstrijdniveau	Volledig + brace

Uitgewerkt weekprogramma per fase

Fase 1 POLICE & pijncontrole Dag 1 – 5	
Doel	<ul style="list-style-type: none"> • Zwelling beheersen, pijn verminderen, beschermd mobiliseren
Oefeningen	<ul style="list-style-type: none"> • POLICE-protocol: ijs 15–20 min, 3–4x per dag — compressie — enkel omhoog • Actieve enkelmobilisatie (zittend): omhoog/omlaag bewegen, rondjes draaien — zoveel als pijnvrij • Alfabet schrijven met de voet in de lucht: 2x per dag • Belast lopen op vlak oppervlak zoveel als pijnvrij mogelijk — krukken indien nodig (graad II/III) • Fietsen (stationair, zadel hoog): 10 min zodra pijnvrij belastbaar • Zwachtelen of enkelbrace dragen bij alle activiteiten buiten rust
Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none"> • Ottawa Ankle Rules: bij twijfel over botbreuk altijd röntgenfoto laten maken • Graad III: altijd doorverwijzen naar arts/fysiotherapeut voor diagnostiek • Nooit direct ijs op huid — gebruik handdoek of ijszak • Ouders informeren: ook thuis ijs en been omhoog

Fase 2 | Beweglijkheid & lichte kracht | Week 1 – 2

Doel	<ul style="list-style-type: none">• Volledig enkelbereik herstellen, kuitmusculatuur activeren, zwelling verder doen afnemen
Oefeningen	<ul style="list-style-type: none">• Enkel dorsaalflexie stretch (knie naar muur): 3x 30 sec per been — essentieel voor looppatroon• Kuitstretching gastrocnemius (knie gestrekt): 3x 45 sec• Kuitstretching soleus (knie gebogen): 3x 45 sec• Bilaterale kuitverhef op vlak: 3x 20 herh. — langzaam neerzakken• Theraband dorsaalflexie (band om voorvoet, naar je toe trekken): 3x 15 herh.• Theraband eversie (naar buiten draaien): 3x 15 herh. — specifiek voor buitenbanden• Balans op één been (stabiel, ogen open): 3x 30 sec — pas als belastbaar zonder pijn
Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none">• Dorsaalflexie-tekort is dé risicofactor voor herververzwikking — dagelijks stretchen• Theraband eversie: versterkt de peroneale spieren die de buitenbanden ondersteunen• Pijn bij bilateraal kuitverhef: terugschalen naar isometrische aanspanning• Zwelling neemt niet af na rust/ijs? Belasting verminderen en evalueren

Fase 3 | Kracht & proprioceptie | Week 2 – 3

Doel	<ul style="list-style-type: none">• Enkelbanden en omliggende musculatuur progressief belasten; proprioceptief systeem herstarten
Oefeningen	<ul style="list-style-type: none">• Unilaterale kuitverhef op vlak: 3x 15 herh. per been — pijnvrij beginnen• Unilaterale kuitverhef op traptree (excentrisch neerzakken): 3x 12 herh.• Theraband inversie/eversie alle richtingen: 3x 15 herh. per richting• Balans op één been (ogen open → ogen dicht → onstabiel oppervlak): 3x 45 sec• Mini-squats op één been (licht gebukte knie): 3x 12 herh. per been• Zijwaartse loopbewegingen: schuifpas op gras, 3x 10 m per kant• Rustig joggen op vlak gras: 2x 10 min bij pijn $\leq 2/10$
Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none">• Proprioceptie is de sleutel tot terugvalpreventie — nooit overslaan of inkorten• Onstabiel oppervlak introduceren pas als stabiele balans >45 sec pijnvrij• 'Giving way' gevoel bij balanswerk: teken van onvoldoende ligamentherstel• Taping of brace dragen bij alle activiteiten buiten oefenzaal

Fase 4 | Functioneel loopherstel | Week 3 – 4

Doel	<ul style="list-style-type: none">• Snelheid, richtingsverandering en atletisch vertrouwen stap voor stap terugbouwen
Oefeningen	<ul style="list-style-type: none">• Loopdrills: marshlopen, haklooptje, knieheffen — oplopend tempo• Versnellen en uitlopen: 5x 20–30 m op gras• Figure-of-8 lopen (grote cirkels, klein wordend): aandacht voor het verzwikte been• Zijwaarts lopen en karaoke: langzaam opbouwen• Enkelvoudige sprongjes voorwaarts (klein): 3x 8 herh., zacht landen• Passing met beide voeten op gras: 15–20 min• Balans op bosubal of wip: 3x 45 sec per been
Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none">• Figure-of-8: begin met grote bogen zodat de enkel minder wordt gedraaid• Richtingsverandering naar de verzwikte zijde: bewust en gecontroleerd opbouwen• Taping bij alle loopactiviteiten• Na training: ijs 15 min als zwelling toeneemt

Fase 5 | Voetbalspecifiek & duels | Week 4 – 5

Doel	<ul style="list-style-type: none">• Terugkeer naar teamtraining, duelbelasting en voetbalspecifieke richtingsveranderingen
Oefeningen	<ul style="list-style-type: none">• Gedeeltelijke teamtraining: eerste 30–45 min zonder intensieve duels• Dribbelen en kegeldribbels met scherpe hoeken: opbouwen per sessie• Schietoefeningen: start met binnenkant, opbouwen naar volledig schot• Sprintduels 1v1: kort, bewust landen na luchtduels• Sprongen en landingen: dubbelbenig → éénbenig bij pijn $\leq 2/10$• Enkel-proprioceptie onderhoud: balans op bosubal 3x/week• Enkelbrace of tape bij elke voetbalactiviteit
Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none">• Trainer informeren: speler mag deelnemen, maar brace/tape is verplicht• Luchtduels: bewust landen op beide voeten — herverzwikking treedt vaak op bij landing• Niet deelnemen aan intensieve duels bij pijn $> 2/10$ of zwelling na vorige training• Dagelijkse pijnscore bijhouden; wekelijks evalueren met sportverzorger

Fase 6 | Volledige terugkeer naar het team | Week 5 – 6

Doel	<ul style="list-style-type: none">• Volledig wedstrijdniveau met preventief enkelprogramma als standaardonderdeel
Oefeningen	<ul style="list-style-type: none">• Volledige teamtraining en wedstrijden zonder beperkingen• Enkelbrace of profylactisch tapen minimaal 6 weken na terugkeer bij elke wedstrijd• Proprioceptie onderhoud: 2x/week balans op onstabiel oppervlak, 3x 45 sec per been• Kuitonderhoud: excentrische kuitverhef 2x/week• Zelfstandige stretchroutine na training: kuit, achillespees, enkelmobilisatie• Landingstechniek bewust trainen: altijd licht gebukte knie bij landing
Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none">• Enkelbrace of tape: minimaal 6 weken na RTP — daarna op eigen voorkeur• Bij herverzwikking binnen 6 weken: direct stoppen en opnieuw starten bij fase 2• Recidief-kans bij onvoldoende revalidatie is 40–70% — neem het programma serieus• Overweeg bij herhaalde verzwikkingen een verwijzing naar fysiotherapeut

Criteria voor terugkeer naar volledige training (Return to Play)

Pijn	Pijnscore $\leq 1/10$ bij wandelen, joggen, springen, landen en zijwaartse bewegingen
Zwelling	Geen of minimale zwelling na training/wedstrijd — vergelijkbaar met niet-aangedane enkel
Kracht	Unilaterale kuitverhef 3x15 pijnvrij; krachtverschil $\leq 10\%$ tussen links en rechts
Proprioceptie	Balans op één been ogen dicht ≥ 30 sec; hop-test (3 richtingen) symmetrisch en pijnvrij
Training	Minimaal twee volledige trainingen inclusief sprint-, sprong- en dueloefeningen pijnvrij
Speler/ouder	Speler en ouder voelen zich klaar; geen angst bij richtingsverandering of duel

Taping en bracegebruik

Profylactisch tapen

Functionele taping (stirrup tape + heel lock) vermindert de kans op herverzwikking met 50–70%. Tape de enkel vóór elke training en wedstrijd tot minimaal 6 weken na terugkeer.

- Benodigde materialen: onderwrap, 38 mm sporttape, eventueel heel/lace pads
- Basistechniek: 2 stirrups + heel lock + figure-of-8 + sluiting — laat je dit aanleren door sportverzorger

Enkelbrace

- Een semirigide enkelbrace is een goed alternatief voor taping, met name bij spelers die zichzelf moeilijk kunnen tapen
- Kies een brace die past in de voetbalschoen — test vooraf
- Vervang de brace bij zichtbare slijtage of verminderde stijfheid

Preventie na terugkeer

- Proprioceptieonderhoud 2x per week — ook bij klachtenvrije spelers ter preventie
- Profylactisch taping of brace bij elke wedstrijd gedurende het hele seizoen na een graad II/III letsel
- Dynamische warming-up inclusief enkelactivatie: enkel-ABC, zijwaartse loopbewegingen, enkelvoudige landingen
- Landingstechniek bewust trainen: licht gebogen knie, actieve voetplaatsing — ook bij kopduel en sprongtraining
- Bij herhaalde verzwikkingen (≥ 2 in 1 jaar): doorverwijzen naar fysiotherapeut voor specifiek neuromusculair programma
- Versleten voetbalschoenen verhogen het risico — controleer regelmatig de zoolstabiliteit

Opgesteld door Sportzorg Jeugd · Dit programma is een richtlijn en vervangt geen individueel medisch advies · Seizoen 2025–2026